

## Caso de paperas confirmado en la escuela secundaria del condado de Livingston

Translation powered by

Un estudiante de la preparatoria Livonia en el condado de Livingston tiene un caso confirmado de paperas, dijo el viernes el distrito escolar.

En una carta dirigida a las familias de los estudiantes de secundaria y preparatoria, el Superintendente Matt Cole dijo que el caso fue confirmado por el Departamento de Salud del Condado de Livingston y recomendó que los padres observen a sus hijos para detectar síntomas de la enfermedad viral.

"Según los profesionales médicos que nos asesoran sobre este asunto, existe un bajo riesgo para nuestros estudiantes, pero existe la posibilidad de que su hijo haya estado expuesto", escribió Cole en la carta. "Si su hijo presenta alguna inflamación de las glándulas alrededor de las orejas o el cuello, manténgalo en casa y comuníquese con el médico de su hijo".

Cole también les recordó a los padres que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés) es la mejor protección contra la enfermedad, y que generalmente se requiere que los estudiantes se vacunen para asistir a una escuela pública.

Las exenciones religiosas o médicas son raras, agregó.

Los padres y las familias que tengan preguntas o inquietudes deben comunicarse con el departamento de salud pública del condado al (585) 243-7299 o con las enfermeras escolares al (585) 346-4000.

### Síntomas de las paperas

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las paperas son una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus, y con frecuencia resultan en la inflamación de las glándulas salivales que causan la característica hinchazón de la cara y la mandíbula.

Los síntomas preliminares incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio y pérdida de apetito. Las mejillas tiernas e hinchadas, el cuello y la mandíbula aparecen de 16 a 18 días después de la infección, según los CDC.

Las paperas son una enfermedad prevenible, y la vacunación MMR se administra típicamente en dos dosis separadas: la primera a los 12 a 15 meses de edad, la segunda a los 4 a 6 años, según los CDC.

Comuníquese con su proveedor de atención primaria para verificar la vacunación y los registros de vacunación de su hijo.

[GSILVAROLE@Gannett.com](mailto:GSILVAROLE@Gannett.com)